DR. KOVÁCS SAROLTA
KS FOGSZABÁLYOZÓ ÉS DENTAL STÚDIÓ

Egészséges arcfejlődés és mosoly

- Szülői útmutató 0-18 éves korig –
Elméleti és gyakorlati kisokos a fogazati rendellenességek megelőzéséhez és korrekciójához

Szakmai vezető & szerző:

Dr. Kovács Sarolta fogszabályozó szakorvos

Kedves Édesanya, Kedves Édesapa!

Amikor megszületik a gyermekünk, a legnagyobb vágyunk, hogy mindent megadjunk neki a boldog, egészséges élethez. Szülőként számtalan kérdés merül fel bennünk: *Miért alszik nyitott szájjal?*



Mikor kell kibújnia az első fogaknak? Baj, ha még négyévesen is szopja az ujját? Mikor kell először megmutatni fogszabályozó orvosnak? Kell-e majd neki fogszabályozó? Elkerülhető a foghúzás kamaszkorban?

Ezt a tudásanyagot azért állítottam össze, hogy tiszta, tudományos, mégis kézzelfogható térképet adjak a kezetekbe csecsemőkortól egészen a kamaszkor végéig.

Szeretettel,

Dr. Kovács Sarolta



1. Korszak: 0–6 éves kor között

A megelőzés aranykora – az alapok lerakása

Ebben az életkorban az arc csontjai olyanok, mint a puha gyurma: a rágóizmok, az ajkak és legfőképpen a nyelv mechanikai terhelése formálja a szélességüket és növekedési irányukat.

A korai prevenció a legértékesebb ajándék a gyermekünknek, de **szülőként sose érezzünk bűntudatot a múlt miatt!** Miért van az, hogy a szülőkhöz nem jutnak el a megfelelő információk? A specifikus prevenciós ismereteknek óriási hiányossága van a hazai képzésekben és ez a legfőbb ok. Sokszor a védőnők, de még a fogorvosok sem ismerik a fogazati rendellenségek megelőzésének a lehetőségeit. Ezért érdemes minden esetben fogszabályozó specialistához fordulni, aki kifejezetten ebben a témakörben jártas.

1.1. Táplálás és biomechanika (0–1 év)

- **Az anyamell természetes tágító ereje:** A szoptatás során a baba alsó állkapcsa aktívan előre-hátra dolgozik, stimulálva az állkapocsízület növekedési zónáját. A nyelv perisztaltikus hullámmal préseli a bimbót a szájpadláshoz, hidraulikusan tágítva a felső állcsontot.
- **Ha cumisüvegre van szükség:** Válasszatok széles bázisú, mellbimbót formázó etetőcumit, és alkalmazzátok a *Paced Bottle Feeding* (lassított etetés) technikát, ahol a babának dolgoznia kell a tejért.
- **Nyelvfék ellenőrzése:** Ha a szoptatás fájdalmas, a baba cuppog, nehezen zár a szája, vagy a nyelve kinyújtva szív alakot vesz fel, mutassátok meg kompetens szakembernek. A lenőtt nyelvfék fizikailag gátolja, hogy a nyelv felérjen a szájpadlásra és ellássa természetes csonttágító funkcióját.

Érdekesség: érdemes a kisbabák szájüregét szoptatás után egy tiszta géz lappal áttörölni, hogy a bakteriális fertőzéseket megelőzhessük.

1.2. A fogzás és fogmosás (6 hónapos – 3 éves kor)

A fogzás egy természetes folyamat és nem betegség, hanem a koponya és a rágószerv természetes érési folyamata. Minden gyermek saját biológiai órával rendelkezik amikor elindul a fogak előtörése. Az alsó középső metszőfogak előtörésével kezdődik, és a tejfogsor kialakulása általában **2,5 és 3 éves kor között** zárul le véglegesen.

Mikor kezdjük a fogmosást? **A legelső kibújt fog legelső napján!** Reggel és este puha sörtéjű babafogkefével, rizsszemnyi mennyiségű 1000 ppm fluoridtartalmú gyermekfogkrémmel.



Szoptatás

Természetes állkapocsizmok fejlesztése



Fogzás

6 hónaptól – 3 éves korig



Fogmosás

Az első fogtól kezdve, minden nap

1.3. A helyes száj- és nyelvtartás (6 hónapos – 3 éves kor)

A növekedés aranyszabálya: Ahol a nyelv pihen éjjel és nappal, oda fog fejlődni a fogív és növekedni az arc.

- **Ideális nyugalmi helyzet:** Az ajkak finoman, ráncolódásmentesen összezárva; a fogak nincsenek összeszorítva, de enyhén összeérhetnek; a nyelv teljes felülete (a hátsó része is!) fenn simul a szájpadláson.
- **A finom állezáró mozdulat:** Ha alvás közben nyitva látjátok a baba száját, a mutatóujjatokkal alulról finoman emeljétek meg az állát, amíg az ajkak összeérnek. Ez reflexesen a szájpadlásra parancsolja a nyelvet. Ugyanez érvényes akár szoptatás után is, ha nyitva marad a szája, óvatosan zárjátok össze az ajkát.
- **Párna nélküli alvás:** A csecsemő lapos, kemény matracon aludjon! A vastag babapárna megtöri a nyaki légutat, ami szájlégzésre kényszeríti a babát.

1.4. Hozzátáplálás és marketingcsapdák (6 hónapos – 3 éves kor)



- **Kezdjetek el korán rágatni:** 6–8 hónapos kortól kínáljatok puha, kézbe vehető darabos zöldségeket (BLW módszer). A csontsejtek a rágóerő mechanikai ingereire építenek stabil, tágas állcsontot.
- **Kerüljétek a tartós pürézést:** A tasakos pürék tartós szopogatása ellustítja a rágóizmokat.
- **Viszlát, csőrös pohár:** A kemény műanyag csőr pontosan úgy tartja lent a nyelvet a szájfenéken, mint a cumi. Váltsatok nyitott pohárra (vagy ferde szélű tanulópohárra), ami automatikusan a helyes nyelést tanítja meg!

- **A cumizás és ujjszopás határa:** Minden olyan eszköz ami a gyerek szájába kerül gátolja a nyelv nyugalmi helyzetét! 1 éves kor után a cumi már deformálja a csontot és elülső nyitott harapást okoz. Amennyiben használtatok cumit törekedjetek arra, hogy 1 éves kor körül végleg elbúcsúzzatok tőle!



Dr. Kovács Sarolta - ATV 2025.09.05. - Start - Prevenció és... 3:50



Fogszabályozó Stúdió és a Láthatatlan Fogszabályozás a... 3:22

0–6 éves kori otthoni ellenőrző lista

Nézzétek meg a gyermeket ma este alvás közben, és pipáljátok ki az alábbi pontokat:

- [ ] **Ajakzáródás**

  Nyugodt alvás közben teljesen összeérnek az ajkai? (Nem láthatóak a metszőfogak vagy a nyelv hegye.)

- [ ] **Csendes légzés**

  Néma az alvása? (Nincs szuszogás, horkolás, nyáladzás a párnára vagy fogcsikorgatás.) Az orrán keresztül veszi a levegőt?

- [ ] **Alváspóz**

  Természetes pózban alszik? (Nem feszíti hátra a nyakát és nem keresi a magasított felületeket.)

- [ ] **Rágási kedv**

  Szívesen elrágja a keményebb falatokat (alma, répa, kenyérhéj), vagy mindent pépesíteni kell?

- [ ] **Fogzás lefolyása**

  Életkornak megfelelő ütemben bújnak a tejfogak, és 2,5–3 éves korra megjelent mind a 20 tejfog?

- [ ] **Nappali viselkedés**

  Kipihenten ébred reggel, nincsenek mély sötét karikák a szeme alatt?



2. Korszak: 6–9 éves kor között

Az első döntő kontroll és a fogváltás térképe

Ez az időszak a vegyesfogazat korszaka: a tejfogak elkezdenek kiesni, és megérkeznek az első, élethosszig tartó maradó fogak. Itt nyílik meg az első igazi szakorvosi beavatkozási ablak!

2.1. A „hollywoodi tejfogsor" csapdája (5–6 éves kor)

- A szülők gyakran büszkék a tökéletesen szabályos, szorosan záródó tejfogsorra. Orvosi szemmel ez **intő jel lehet:** a maradó metszőfogak másfélszer nagyobbak, mint a tejfogak! 5–6 éves korra a tejfogak között jól látható réseknek kell megjelenniük. Ha nincsenek rések, az állcsont szűk maradt – a maradó fogak garantáltan torlódni fognak.

2.2. Miért a 7 éves kor a nemzetközi aranystandard?

> ⓘ Az Amerikai Fogszabályozó Szövetség (AAO) és a modern protokollok szerint **legkésőbb 7 éves korban** minden gyermeket látnia kell fogszabályozó szakorvosnak.

- **Nem a fogakat tologatjuk:** Ebben a korban a csontos szájpadlási varrat még rendkívül képlékeny, lágy kötőszövetes összeköttetés.
- **Csonttágítás műtét nélkül:** Ha az állcsont szűk, egy kíméletes, belső tágító készülékkel magát a csontos bázist tudjuk kiszélesíteni, helyet teremtve a még elő nem törő maradó fogaknak.
- **Az orrüreg megnyitása:** A kemény szájpadlás egyben az orrüreg padlója. Amikor tágítjuk a szájpadlást, azonnal megnő az orrjáratok keresztmetszete: a szájlégző gyermek végre szabadon kap levegőt az orrán át!

2.3. Vészhelyzetek a fogváltásban, amikre tilos várni:

Elülső kereszttharapás

Amikor a felső metszőfog az alsó fogak mögé harap be. Fizikailag blokkolja a felső állcsont természetes növekedését – azonnali beavatkozást igényel.

Oldalsó kereszttharapás

Ha a gyermek rágáskor félrehúzza az állkapcsát, a csont ferdén fejlődik, maradandó arcszerkezeti aszimmetriát okozva.

Korai tejőrlő-vesztés

Ha egy tejfogat szuvasodás miatt ki kell húzni, a mögötte lévő hatos maradó fog előredől és „ellopja" a helyet (helyfenntartó készülék szükséges!).

6–9 éves kori szülői ellenőrző lista

Ellenőrizzétek az alábbi pontokat rendszeresen, és pipáljátok ki megfigyelés közben:

- [ ] **Ajakzárás**

  Nyugodt alvás közben teljesen összeérnek az ajkai? (Nem láthatóak a metszőfogak vagy a nyelv hegye.)

- [ ] **Csendes légzés**

  Néma az alvása? (Nincs szuszogás, horkolás, nyáladzás a párnára vagy fogcsikorgatás.) Az orrán keresztül veszi a levegőt?

- [ ] **Alváspóz**

  Természetes pózban alszik? (Nem feszíti hátra a nyakát és nem keresi a magasított felületeket.)

- [ ] **Rágási kedv**

  Szívesen elrágja a keményebb falatokat (alma, répa, kenyérhéj), vagy mindent pépesíteni kell?

- [ ] **Nappali viselkedés**

  Kipihenten ébred reggel, nincsenek mély sötét karikák a szeme alatt?

- [ ] **Fogközök ellenőrzése**

  Vannak apró hézagok a tejfogak között 5-6 évesen, vagy szorosan összeérnek?

- [ ] **Keresztharapás teszt**

  Amikor összezárja a fogait, mindenhol a felső fogsor fedi kívülről az alsót?

- [ ] **Hatos fogak figyelése**

  Megjelentek-e már 6 éves kor körül a leghátsó tejfogak mögött az első maradó nagyőrlők? (Ezek nem váltanak tejfogat!)

- [ ] **Rágási szimmetria**

  Középen záródik az álla, vagy elcsúszik jobbra/balra rágáskor?

- [ ] **Első szűrés**

  Látta már fogszabályozó szakorvos a gyermeketeket a 7. születésnapja körül?







3. Korszak: 10–18 éves kor között

A kamaszkor és az élethosszig tartó stabil mosoly

Ha a korai években nem történt beavatkozás és a kamaszkorra súlyos harapási eltérés, torlódás alakult ki: **nincs minden veszve!** A tinédzserkor eleje tartogatja a testünk utolsó, óriási biológiai növekedési ablakát.

3.1. A pubertáskori növekedési ugrás kihasználása (10–14 év)

- Sokan mondják: *„Várjuk meg, amíg az összes tejfog kiesik, és 15 évesen ráérünk fogszabályozni."* **Ez az egyik legveszélyesebb tévhit!**
- A növekedési ugrás alatt (lányoknál általában 10–12 év, fiúknál 12–14 év) az állcsontok még aktívan reagálnak az ortopédiai erőkre.
- Ekkor még képesek vagyunk a hátraesett alsó állkapcsot előrefelé stimulálni, és a szűk felső ívet csontosan tágítani. Amikor a növekedési zónák elcsontosodnak (lányoknál a menstruáció kezdete után 1–2 évvel), a csontos korrekció természetes ablaka végleg bezárul.

3.2. Modern technológiák kamaszkorban - foghúzás és műtét nélküli megoldások

A régi iskola: Ha nem fértek el a fogak, a legegyszerűbb megoldás 4 ép maradó kisőrlő kihúzása volt, hogy a maradék fogakat egyenesbe lehessen húzni (ez azonban gyakran beesett ajkakat, lapos arcprofilt és beszűkült garati légutat eredményezett).

Modern láthatatlan sínes rendszerek (Invisalign Teen): Digitális tervek alapján gyártott készülék, teljesen fémmentes, átlátszó sínek sorozatával dolgozik. Étkezéshez kell csak kivenni, ezen kívül egyész nap viselni kell. Mivel kivehető a fogmosás tökéletesen kivitelezhető így minimalizálva a fogszuvasodás és az ínygyulladás kockázatát.



- **Észrevehetetlen & kivehető:** Átlátszó sínek, amik nem látszanak a fotókon és a suliban sem, és egy pillanat alatt kivehetők.
- **Kényelmes:** Sima felületű, nincsenek fém alkatrészek, amik felsértenék a szájat.
- **Kötöttségek nélkül:** Bármit szabad enni a kezelés ideje alatt.
- **Kevesebb hiányzás:** Ritkább orvosi kontrollt igényel, így nem kell miatta kiesni az iskolából vagy az edzésekről.

10–18 éves kori szülői ellenőrző lista

Ellenőrizzétek az alábbi pontokat rendszeresen, és pipáljátok ki megfigyelés közben:

☐

Ajakzárás

Nyugodt alvás közben teljesen összeérnek az ajkai? (Nem láthatóak a metszőfogak vagy a nyelv hegye.)

☐

Csendes légzés

Néma az alvása? (Nincs szuszogás, horkolás, nyáladzás a párnára vagy fogcsikorgatás.) Az orrán keresztül veszi a levegőt?

- [ ] **Alváspóz**

  Természetes pózban alszik? (Nem feszíti hátra a nyakát és nem keresi a magasított felületeket.)

- [ ] **Rágási kedv**

  Szívesen elrágja a keményebb falatokat (alma, répa, kenyérhéj), vagy mindent pépesíteni kell?

- [ ] **Nappali viselkedés**

  Kipihenten ébred reggel, nincsenek mély sötét karikák a szeme alatt?

- [ ] **Profilvizsgálat oldalról**

  Nagyon hátra van esve az alsó álla a felsőhöz képest? Vagy túlzottan előreugrik?

- [ ] **Mosoly-esztétika**

  Mosolygáskor láthatóak a felső metszőfogak, vagy csak az alsók? Vannak sötét, üres rések a szájszél és a fogak között (szűk mosolyív)?

- [ ] **Ízületi hangok**

  Kattog, recseg az állkapcsa rágáskor vagy ásításkor? Panaszkodik reggeli tompa fejfájásra?

- [ ] **Légzés és sport**

  Sportolás közben kapkodja a levegőt, hamar kifullad, csak nyitott szájjal tud futni?

- [ ] **Önbizalom**

  Szívesen mosolyog a képeken, vagy reflexből eltakarja a száját a kezével?

Összefoglaló: mikor forduljatok azonnal szakorvoshoz?

Életkortól függetlenül érdemes elmenni egy állapotfelmérésre, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztaljátok:

Krónikus szájlégzés vagy horkolás

A gyermekkori horkolás sosem normális, mindig oxigénhiányra utal!

Tartós ujjszopás vagy cumizás

3 éves kor felett már komoly fogfejlődési problémát okozhat.

Beszédhibák, lenőtt nyelvfék

Szopási nehézségek, lenőtt nyelvfék gyanúja esetén azonnal fordulj szakemberhez!

Keresztharapás

Akár egyetlen fognál, akár a teljes oldalsó rágózónában.

Mélyharapás

A felső fogak teljesen eltakarják az alsókat összeharapáskor.

Nyitott harapás

Az alsó és felső fogsor eltart, nem tud elharapni egy szendvicset.

7 éves kor után első szűrés

Elmúlt 7 éves a gyermek, és még nem látta fogszabályozó szakorvos.

⚠ **Ne várjatok!** A korai beavatkozás mindig egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb megoldást jelent, mint a késői korrekció. A legtöbb probléma megelőzhető, ha időben felismerjük.

Tedd meg az első lépést!



Most már minden információ a kezedben van ahhoz, hogy magabiztosan dönts gyermeked fogegészségéről. A korai szűrés és a tudatos megelőzés a legjobb befektetés, amit gyermeked jövőjébe tehetsz.

Rendelőnkben személyre szabott digitális tervezéssel, modern technológiával és empatikus szakmai csapattal várunk. Célunk, hogy ne csak szép, hanem **egészséges és hosszú távon stabil** mosolyt alkossunk számotokra – mert a fogszabályozás számunkra nem csupán esztétika, hanem hivatás.

KS Fogszabályozó és Dental Stúdió Csapata

Időpontfoglalás | Kapcsolat | Tudj meg többet